

dr Jarosław Tolwaj
MEDYCYNA ESTETYCZNA

INFORMACJA O ZABIEGACH Z TOKSYNĄ BOTULINOWĄ

PRZECIWWSKAZANIA

- stwierdzona nadwrażliwość na toksynę botulinową typu A
- infekcja w przewidywanym miejscu wstrzyknięć
- rozpoznane choroby: miastenia rzekomoporaźna, zespół Eaton-Lamberta, stwardnienie zanikowe boczne
- przyjmowanie antybiotyków aminoglikozydowych
- zaburzenia krzepnięcia
- ciąża, karmienie piersią

REAKCJE NIEPOŻĄDANE, POWIKŁANIA

- ból głowy (często), zawroty głowy (rzadko)
- odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia (rumień, obrzęk, wysypka itp.)
- zaburzenia oka: łzawienie, opadnięcie powieki, obrzęk powiek, zespół suchego oka, drganie mięśni wokół oka, podwójne widzenie
- niezamierzonym efektem zabiegu może być dyfuzja toksyny do mięśni nie poddanych zabiegowi co skutkuje osłabieniem funkcji mięśni sąsiadujących (np. ptoza)

ZALECENIE PRZED ZABIEGIEM

Na kilka dni przed zabiegiem odstawić leki przeciwzakrzepowe (np. preparaty aspiryny) jeśli nie ma przeciwwskazań

Można przyjmować zapobiegawczo preparaty wzmacniające naczynia krwionośne (np. Rutinoscorbin)

ZALECENIA POZABIEGOWE

bezpośrednio po zabiegu zaleca się umiarkowane marszczenie ostrzykniętej oklicy

przez 4-5 godzin po zabiegu

- nie kłaść się, nie schylać, nie wysilać
- w dniu zabiegu nie spożywać alkoholu

do dwóch tygodni po zabiegu

- nie nagrzewać miejsc wkłucia, unikać słońca, nie korzystać z solarium
- nie masować miejsc wkłucia